

|  |
|--|
| <b>GÖĞÜS KAFESİNDEKİ ÖNE DOĞRU ÇIKINTININ<br/>(PEKTUS KARINATUM) CERRAHİ TEDAVİSİ İÇİN<br/>BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ</b> |
|--|

**Hastanın;**

Adı - Soyadı :  
Doğum Tarihi(gün/ay/yıl):  
Protokol No :

Sayın hastamız lütfen bu belgeyi dikkatlice okuyunuz. Tıbbi durumunuz ve hastalığınızın tedavisi için size önerilen işlem/ tedaviler hakkında bilgi sahibi olmak en doğal hakkınızdır. Bu açıklamaların amacı sağlığını ile ilgili konularda sizi bilgilendirmek ve bu sürece sizi daha bilinçli bir biçimde ortak etmektir. Burada belirtilenlerden başka sorularınız varsa bunları cevaplamak görevimizdir. Tanısal girişimlerin, tıbbi ve cerrahi tedavilerin yararlarını ve olası risklerini öğrendikten sonra yapılacak işleme rıza göstermek ya da göstermemek kendi kararınıza bağlıdır. Arzu ettiğiniz takdirde sağlığını ile ilgili tüm bilgi ve dokümanlar size veya uygun göreceğiniz bir yakınınıza verilebilir. Okuma - yazma sorunu yaşıyorsanız ya da size yapılacak işlemlere izin verme sürecine sizin belirleyeceğiniz bir kişinin daha katılmasını istiyorsanız, görüşme tanığı olarak belirlediğiniz kişinin katılmasına izin verebilirsiniz. Yasal ve tıbbi zorunluluk taşıyan durumlar dışında bilgilendirmeyi reddedebilirsiniz. İstedığınız zaman verdiğiniz izni geri çekme hakkına sahipsiniz. Bu durum sizin bundan sonraki tedavinizi hiçbir şekilde aksatmayacaktır. Ancak, yasal açıdan bu hakkınız "tıbbi yönden bir sakınca bulunmaması" şartına bağlıdır. Bu durum gerçekleştiğinde, "**Bilgilendirme Ve Rıza Belgesini Geri Çekme Tutanağı**" düzenlenerek bu belgenin arkasına eklenecektir.

**1. BİLGİLENDİRME****1.1. Genel Açıklamalar**

Şikayetiniz nedeniyle başvurmuş olduğunuz hastanemizde yaptığımız muayene, tetkikler ve incelemeler sonucunda, **Göğüs Kafesinde öne doğru çıkıntı (Pektus Karinatum = Güvercin Göğsü Deformitesi)** tespit ettik. Bu hastalık doğuştan meydana gelmektedir. Deformite zamanla artabilir. Özellikle hızlı büyümenin olduğu ergenlik döneminde artma eğilimindedir. Ailedeki diğer bireylerde de görülebilir. Birlikte diğer vücut anomalilerinin görülme sıklığı artmıştır. Bazen, göğüs duvarının bir kısmı öne doğru çıkıntı yapmış, bir kısmı ise içe doğru girinti yapmış olabilir. Bu deformitenin cerrahi tedavisinde, başarı oranı yüksektir (%95-%98). Yapılacak operasyonun amacı postürü düzeltmek ve psikolojik problemleri önlemektir. Operasyon için en uygun dönem açık ameliyat için 5-12 yaş, kapalı ameliyat için 12-16 yaş arasındadır.

**Ameliyattan Önce:** Bir hekim size ne yapılacağını anlatacak ve işlemi kabul etmeniz halinde bir bilgilendirme ve rıza belgesi imzalatacaktır. Bu belgeyi imzalamanız, tüm işlemi anladığınızdan emin olmak için gereklidir. Eğer herhangi bir soru ya da kaygınız varsa, lütfen çekinmeden sorunuz.

**Ameliyat süreci:** Operasyon genel anestezi altında yapılacağından anesteziye ilişkin bilgi ve olası riskler ilgili uzman tarafından size ayrıntılı olarak anlatılacak ve ayrı bir bilgilendirme ve rıza belgesi imzalatılacaktır. Ameliyat iki şekilde yapılabilir;

**a- Kapalı metot (Minimal invazif teknik):** Bu teknikte göğüs ön duvarı kesisine, kasların kaldırılmasına, kıkırdak ve kemiklerin kesilmesine gerek yoktur. Her iki göğüs kafesinin yanlarından 2-3 cm' lik kesi yapılır. Göğüs kemiği üzerinden göğüs kafesinin içine girilmeden bir tünel açılır ve bu tünelden hastaya uygun ayarlanmış çelik bar geçirilir, bar deformitenin özelliğine uygun olarak döndürülür ve deformitenin düzeltilmesi sağlanır. Ardından, her iki yan, çelik sabitleyiciler ile, bu sırada hazırlanmış kaburgalara tespit edilir. Operasyon genellikle 1-2 saat sürer. Nadiren, bazı hastalarda göğüsteki şekil bozukluğu kapalı ameliyat tekniği ile düzeltilememektedir. Bazen de, ameliyat sırasında önemli komplikasyonlar oluşabilmektedir. Bu durumlarda açık ameliyata geçilmektedir. Planlanan işlem sırasında, beklenmeyen veya istenmeyen bazı durumlarla karşılaşabilir. Böyle bir durumda, sizin sağlığını için en uygunu olması şartıyla ek girişimler yapılabilir.

**b- Açık metot;** göğüs ön duvarından deformitenin büyüklüğüne göre kesi yapılır. Göğüs ön duvar kasları kaldırılarak deforme olmuş kıkırdak kısımlar ve bazen de kaburga kısımları çıkarılır. Deforme olmuş sternum (iman tahtası) düzeltilerek etraf dokulara tespit edilir. Ameliyat genellikle 2-4 saat sürer. Planlanan işlem sırasında, beklenmeyen veya istenmeyen bazı durumlarla karşılaşabilir. Böyle bir durumda, sizin sağlığını için en uygunu olması şartıyla ek girişimler yapılabilir.

**Ameliyattan Sonra:** Ameliyattan sonra durumunuza göre servis veya yoğun bakıma alınabilirsiniz. Bir süre (ortalama 6 saat) size ağızdan yemek verilmeyecek, damar yoluyla besleneceksiniz. Bir süre geçtikten sonra sizden yürümek, derin nefes alıp vermek, öksürmek, solunum egzersizi için çeşitli aletleri kullanmak dahil çeşitli etkinliklerde bulunmanız istenebilir. Yattığınız süre içerisinde damar içi, kas içi, cilt altı, ağız veya solunum yoluyla

|  |
|--|
| <b>GÖĞÜS KAFESİNDEKİ ÖNE DOĞRU ÇIKINTININ<br/>(PEKTUS KARINATUM) CERRAHİ TEDAVİSİ İÇİN<br/>BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ</b> |
|--|

size çeşitli ilaçlar verilecektir. Verilecek ilaçlar ile ilgili olarak ayrıca bilgilendirileceksiniz. Tüm bu tedbirler daha kısa sürede iyileşmenizi sağlamak ve istenmeyen durumların ortaya çıkmasını önlemek amacıyla taşımaktadır. Hastanede kalış süreniz ortalama 3-5 gün olsa da bu süre iyileşme, istenmeyen durum görülmesi gibi durumlara bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Taburculuk sonrasında bazı ilaçlara devam etmeniz istenecektir. İlaçları ne süreyle ve nasıl kullanacağınız ve poliklinik kontrolüne ne zaman geleceğiniz doktorunuz tarafından size ayrıntılı olarak anlatılacak, unutmamanız için epikrizinize işlenecektir. Dikişlerinizin alınma süresi yaranızın durumuna göre ameliyat sonrası 7-10 gündür. Kapalı teknikle uygulanan çelik bar ortalama 3 yıl yerinde tutulur ve genel anestezi altında çıkartılır. İlk 6 hafta, yürüyüş dışında, hiç bir sportif aktiviteye katılmamanız istenmektedir. Bu süre içinde, uyurken sırtüstü yatmanız gerekmektedir. 3 aydan sonra, koşma ve yüzme egzersizleri verilebilmekte, 6 aydan sonra tüm sporlar yapılabilmektedir.

**1.2 Göğüs Kafesindeki Öne Doğru Çıkıntının (Pektus Karinatum) Cerrahi Tedavisinden Beklenen Faydalar**  
Yapılacak operasyonda amaç postürü düzeltmek ve psikolojik problemleri önlemektir.

**1.3 Göğüs Kafesindeki Öne Doğru Çıkıntının (Pektus Karinatum) Cerrahi Tedavisinin Uygulanmaması Durumunda Karşılaşılabilecek Sonuçlar**

Hastaların çoğu fiziki görüntüden şikâyet ederler ve okul çağında psikososyal problemlere neden olur. İlerlemiş deformitelerde tekrarlayan solunum yolu enfeksiyonları ya da kardiyak ritim bozuklukları görülebilir.

**1.4 Göğüs Kafesindeki Öne Doğru Çıkıntının (Pektus Karinatum) Cerrahi Tedavisinin Alternatifleri**

Göğüs bastırma ortezi denilen bir alet kullanılabilir, ancak bu aleti günde en az 6 saat uygulamak gerekir. Bu sırada basıya bağlı cilt lezyonları ve ağrı oluşabilir. Bu metot ile tedavi süresi yaklaşık 2 yıldır.

**1.5 Göğüs Kafesindeki Öne Doğru Çıkıntının (Pektus Karinatum) Cerrahi Tedavisinin Tahmini Süresi**

Kapalı metot (Minimal invazif teknik) ile yapılan operasyon genellikle 1-2 saat, açık metot ile yapılan operasyon genellikle 2-4 saat sürer.

**1.6 Göğüs Kafesindeki Öne Doğru Çıkıntının (Pektus Karinatum) Cerrahi Tedavisinin Riskleri Ve Komplikasyonları**

Bazen cerrahiye bağlı istenmeyen çeşitli durumlar ortaya çıkabilmektedir. Kapalı operasyonlarda ender de olsa; pektus barının yer değiştirmesi (%5.8), pnömotoraks (akciğer sönməsi) (%3), zatürree (%1), nikel kaplama çelik bar ve yara yeri enfeksiyonu (%1.1), perikardit (kalp zarı iltahabı) (%0.4), bar alerjisi (%2.9), nöks (%0.8), hemotoraks (göğüs boşluğuna kanama) (%0.2) görülebilmektedir.

**Ağrı:** Özellikle erken dönemde şiddetli ağrılar olabilir. Bazen kapalı ameliyat tekniği ile yerleştirilen çelik barlara karşı dayanılmaz ağrılar olabilir ve barların çıkartılmasına kadar giden derecede ağrılar görülebilir.

**Kanamalar:** Belli bir miktara kadar olan ve klinik olarak önemsiz kabul edilen kanamalar dışında ender de olsa ciddi ve acil ameliyat gerektiren kanamalar görülebilmektedir. Bazı hastalarda çok nadir de olsa kalp yaralanması görülebilmektedir.

**Uzamış Hava Kaçağı:** Belli bir süre, akciğerden akciğer zarları arasına az miktarda hava geçmesi ve bunun akciğer zarları arasına yerleştirmiş olduğumuz dren aracılığıyla çıkması görülebilir. Ancak bu sürenin 5-7 gün geçmesi uzamış hava kaçağı olarak adlandırılan ve hava kaçağı olan yeri tamir etmek için yeniden ameliyata alınmayı gerektiren istenmeyen bir durumdur.

**Atelektazi:** Ameliyat sonrasında yeterli solunum ekzersizi yapmama, öksürüp balgam çıkarmama, hareketsizlik, iltihap, yakın zamana kadar sigara içme, gibi nedenlere bağlı olarak ortaya çıkan ve atelektazi denen, akciğerin bir kısmı veya tamamının sönməsi durumudur. Bu durum ilk etapta bir takım ilaçlar, solunum fizyoterapisi ve burundan girilen bir sonda aracılığıyla balgamın emilmesi (nazotrakeal aspirasyon) ile aşılmaya çalışılacak olsa da, biriken ve yoğunlaşmaya yüz tutmuş balgamı çıkarmak amacıyla bronkoskopi denen bir işlem yapılabilir. Bu işlem; lokal anestezi ile FOB (Fiberoptik bronkoskopi) ile veya genel anestezi altında bir boru aracılığıyla, tıkalı olan bronşa girilerek vakum etkili bir alet ile balgamın emilerek çıkarılmasından ibarettir.

|  |
|--|
| <b>GÖĞÜS KAFESİNDEKİ ÖNE DOĞRU ÇIKINTININ<br/>(PEKTUS KARINATUM) CERRAHİ TEDAVİSİ İÇİN<br/>BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ</b> |
|--|

**Pektus Bar Yer Değiřtirmesi:** Ameliyat sırasında takılan pektus bar göğüs kafesine sabitlenir. Tüm önlemler alınsa da yerleřtirilen paktus bar yer deęiřtirebilir. (Saę ya da sol göğüs kafesine doęru hareket ederek ciltten silüeti görünür hale gelebilir, pektus bar ters dönebilir).

**Kifoskolyoz (Omurgada eğrilik):** Hastada güvercin göğsü ile beraber omurga eğrilięide eřlik edebilir. Omurgadaki eğrilik ameliyattan sonra aynı kalabilir ya da daha da ilerleyebilir. Bu durumda bar çıkarma iřlemi ve/veya ortopedi tarafında skolyoz için ek tedavi ve ameliyatlar gerekebilir.

**Nüks:** Ameliyat sonrasında hastalıęınızın nüksmesi nadiren (%0.8)söz konusu olabilir.

**Dięer Komplikasyonlar:** Hareket kısıtlılıęı, sportif aktivitelerden uzak kalma, solunum ve fiziksel performans kapasitesinde azalma, solunum yetmezlięi, geçici veya kalıcı ses kısıklıkları, nefes borusu yaralanması, akcięer dokusu veya göğüs duvarı ięerisinde apse geliřimi, zaturre, solunum yetmezlięi, toplardamar pıhtılařması, akcięer embolisi, ampiyem, mediastinit, kesi bölgesinde hafif uyuřukluk hissi ya da kalıcı nedbe geliřimi, uzun süreli aęrı, kemik çıkarılması-eklenmesi sonucu göğüs veya vücutta řekil bozukluęu, uygulamalar sırasında pozisyon vermeye baęlı kısa ya da uzun süreli aęrı-uyuřukluk, ameliyat esnasında ve sonrasında kullanılan ilaç ve tıbbi malzemelerin kullanımına baęlı olarak tıbbi literatürde tanımlanmıř sorunlar geliřebilir. Kalp ritim bozuklukları, ani kalp durması, alerjiler, organ yetmezlikleri, sara nöbetleri gibi istenmeyen durumlar ender olsa da bilmeniz gereken ve karřılařılabilecek durumlardandır. Bu istenmeyen durumlara ek olarak; kan ve kan ürünü verilmesine baęlı ateř, kan reaksiyonları, böbrek yetmezlikleri, kemik ilięi yetmezlięi sonucu kan üretiminin durması, sarılık, tetkiki yapıldıęı halde kan yoluyla bulařan hepatit, AIDS gibi hastalıklar ortaya çıkabilir.

**Ölüm:** Ameliyatın kendisine veya ameliyat sonrası geliřen istenmeyen durumlara baęlı ölüm görölme oranı %0.1 civarındadır.

**1.7 Pektus Barın Çıkarılması:** Güvercin göğsü hastalıęı nedeniyle daha önceden ameliyat ile konulan pektus bar genel anestezi altında çıkarılacaktır (Genel anesteziye ait bilgilendirme formu ayrıca imzalatılacaktır). Pektus bar daha önceki ameliyat bölgelerinden (saę, sol ve/veya her iki tarafa kesi yapılarak) kesi yapılarak çıkarılacaktır. Bar çıkarma esnasında hafif ya da ciddi (çok nadir) kanamalar olabilir. Çok nadirde olsa kalbe ait yaralanmalar olabilir.

**Yukarda bazıları açıklanmıř olan tüm bu istenmeyen durumların önlenmesi için gerekli tedbirler alınacaktır, ancak bu durumların ortaya çıkıp çıkmayacaęının önceden kestirilmesi oldukça güçtür. Bu nedenle Bilgilendirme ve Rıza Belgesini imzalayarak tüm bu riskleri bildięinizi ve Göğüs Kafesindeki Öne Doğru Çıkıntının (Pektus Karinatum) Cerrahi Tedavisini kabul ettięinizi beyan etmiř olacaksınız.**

### 1.8 Maliyet

- Sosyal Güvenlik Kurumuna mensup hastalarımızın yattıkları süre ięerisindeki masrafları kurumlarından tahsil edilmekte olduęundan ek bir ödeme yapmanız gerekmemektedir.
  - Özel saęlık sigortalı hastalarımızın, sigorta řirketleriyle yaptıkları anlaşma hükümlerine göre ek ödeme yapmaları gerekebilir.
  - Herhangi bir sigortası olmayan hastalarımızın hastane masraflarını kendileri ödemeleri gerekmektedir.
- Durumunuzu bildirmeniz durumunda doktorunuz sizi ilgili personele yönlendirecek, ortalama maliyet ile ilgili olarak ayrıntılı řekilde bilgilenenizi saęlayacaktır.

**GÖĞÜS KAFESİNDEKİ ÖNE DOĞRU ÇIKINTININ  
(PEKTUS KARINATUM) CERRAHİ TEDAVİSİ İÇİN  
BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ**

**2- ONAM (RIZA, İZİN)**

- Doktorumdan tıbbi durumumun tanı ve tedavisi ile ilgili yapılacak tıbbi / cerrahi tedavi veya tanı amaçlı girişimler konusunda bilgi aldım.
- Tedavi sırasında oluşabilecek olumsuzluklar ve olası riskleri ayrıntıları ile anlatıldı. İşlemin kim tarafından yapılacağını biliyorum.
- Ameliyatın yararları kadar riskleri ve komplikasyon adı verilen, istenmeyen ancak oluşması muhtemel olumsuz sonuçları olabileceğini ve sonuca ilişkin herhangi bir garanti verilemeyeceğini biliyorum.
- Ameliyatın yaklaşık olarak ne kadar süreceği ve girişim yolu ile ilgili ayrıntılı olarak bilgilendirildim.
- Bana önerilen tanı ve tedavi yöntemlerini reddettiğim zaman sağlığımı tehdit edici başka hangi risklerin olabileceği, bu tedavi yerine uygulanabilecek bir başka tedavi yönteminin bulunup bulunmadığı konusunda bilgilendirildim.
- Doktorlarımin planladıkları girişim ve/veya tedavilerde, planladıklarına ek girişim ve tedaviler gerektirebilecek durum ya da durumlar ile karşılaşabileceğimi biliyorum.
- Hastalığım nedeni ile hastanede uygulanacak tüm tanı ve tedavi yöntemlerinin olası maliyeti konusunda gerekli bilgiler bana anlatıldı.
- Bu formda tanımlananlar dışında yapılacak herhangi bir ek girişimin, yalnızca sağlığıma yönelik ciddi zararların önlenmesi ve yaşamımın kurtarılması için uygulanabileceği bana anlatıldı.
- **Anestezi alacak hastalar için:** Durumum aciliyet göstermediği sürece, işlemden önce anestezinin ayrıntılarını bir anestezi uzmanı ile tartışma fırsatım olduğu ve bunun için ayrı bir belge düzenleneceği bana anlatıldı.

- Bu belgede tanımlanan girişimin / tedavinin uygulanmasını:

**KABUL EDİYORUM.**  **KABUL ETMİYORUM.**

- Kimliğimin gizli tutulması ve yalnızca eğitim ve araştırma amaçlı kullanılması koşulu ile bana uygulanacak girişim/tedavi sırasında fotoğraf çekilmesine ya da kayıt yapılmasına:

**İZİN VERİYORUM**  **İZİN VERMİYORUM**

- Kimliğimin gizli tutulması ve yalnızca eğitim, araştırma ve bilimsel amaçlı kullanılması koşulu ile tıbbi kayıtlarımdaki bilgiler ile tanı/tedavi amacıyla vücudumdan alınan hücre, doku ya da sıvı örneklerinin kullanılmasına, bilimsel toplantı ve dergilerde sunulmasına:

**İZİN VERİYORUM**  **İZİN VERMİYORUM**

Bu bölüme hasta/kanuni velisi, vasisi tarafından "OKUDUM, ANLADIM" yazılacaktır

Hastanın Adı - Soyadı – İmzası : ..... Tarih: .... / .... / .... Saat: .....

Hastanın Velisi/Yasal Vasisinin Adı–Soyadı–İmzası : ..... Tarih: .... / .... / .... Saat: .....

Şahit, Adı - Soyadı – İmzası : ..... Tarih: .... / .... / .... Saat: .....

İşlemi/Bilgilendirmeyi Yapan Hekimin Adı– Soyadı – Unvanı—İmzası : ..... Tarih: .... / .... / .... Saat: .....